



# Bilan de la qualité de l'air à proximité du duplex A86

BILAN 2019





# BILAN 2019 DE LA QUALITE DE L'AIR A PROXIMITE DU DUPLEX A86

**Novembre 2020**

**Etude réalisée par :**

AIRPARIF – Observatoire de surveillance de la qualité de l'air en Île-de-France  
7, rue Crillon 75004 PARIS – Tél. : 01 44 59 47 64 - Site : [www.airparif.fr](http://www.airparif.fr)

**Pour :**

COFIROUTE  
12, rue Louis Blériot CS 30035 92506 RUEIL- MALMAISON Cedex – Tél : 01 55 94 71 52

# SOMMAIRE

I.	CONTEXTE	4
II.	NORMES DE QUALITE DE L'AIR	5
III.	SITUATION PAR RAPPORT AUX NORMES DE QUALITE DE L'AIR	7
IV.	QUALITE DE L'AIR SUR LE DOMAINE	8
	IV.1. Dioxyde d'azote	9
	IV.1.1. NO <sub>2</sub> à l'échelle annuelle	9
	IV.1.2. NO <sub>2</sub> à l'échelle horaire	11
	IV.2 Particules - PM <sub>10</sub> - PM <sub>2.5</sub>	12
	IV.2.1. PM <sub>10</sub> à l'échelle annuelle	12
	IV.2.2. PM <sub>10</sub> à l'échelle journalière	14
	IV.2.3. PM <sub>2.5</sub> à l'échelle annuelle	15
	IV.3. Benzène	16
	IV.4. Monoxyde de carbone	16
V.	CONCLUSION	17

# I. CONTEXTE

## Observatoire du duplex A86

Un observatoire de la qualité de l'air a été mis en place autour du Duplex A86 suite aux engagements de l'Etat dans le cadre du bouclage souterrain de l'A86 à l'ouest de l'agglomération parisienne. Trois objectifs distincts se détachent à la vue des préconisations de l'Etat pour l'observatoire :

- Evaluer l'impact des ouvrages sur la qualité de l'air.
- Assurer une surveillance permanente de la qualité de l'air dans le secteur des ouvrages à partir de leur mise en service.
- Générer une information régulière et accessible au public sur la qualité de l'air dans l'environnement des nouvelles infrastructures.




Figure 1 : Tracé du Duplex A86 (source COFIROUTE)

Figure 2 : Page d'accueil du site internet de l'observatoire


## COFIROUTE, partenaire historique de l'observatoire

En tant que concessionnaire et exploitant des tunnels de l'A86 « Ouest », COFIROUTE a sollicité AIRPARIF, association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air en Île-de-France, pour la conception et la mise en œuvre de cet observatoire.

**Un système de modélisation et de cartographie de la pollution** heure par heure sur le secteur d'étude a été mis en place. La plateforme de modélisation est décrite dans le document « Mise en œuvre d'un observatoire de la qualité de l'air – bouclage de l'A86 à l'Ouest - Système de cartographie de la qualité de l'air » (avril 2010).

## Informations en temps réel sur le site

Le site internet de l'observatoire (<http://www.obsairvatoire-a86ouest.fr>) présente en temps réel les cartographies horaires de la qualité de l'air au voisinage du Duplex A86 et regroupe les travaux menés dans le cadre de cet observatoire.



En 2019, **2478 visites** ont été effectuées sur le site internet dédié à l'observatoire de l'A86.

A noter que le site connaît des **pics de connexions** durant les périodes où sont enregistrés les épisodes de pollution.

Le présent rapport s'attache à étudier les concentrations dans le secteur ouest de l'agglomération parisienne et au voisinage immédiat des têtes de tunnel et des unités de ventilation. Les cartographies présentées dans ce bilan ont été réalisées à partir des cartographies horaires issues de la plateforme de modélisation. Ces cartographies annuelles renseignent les niveaux de pollution au regard des normes françaises et européennes pour l'année 2019.

Après un rappel des normes de la qualité de l'air et une présentation de la situation atmosphérique générale dans la zone de surveillance du Duplex A86 au regard de la situation francilienne, ce chapitre détaille les niveaux du secteur d'étude, polluant par polluant.

## II. NORMES DE QUALITE DE L'AIR

Les directives européennes et les critères nationaux de la qualité de l'air définissent des niveaux réglementaires pour des échelles temporelles distinctes : concentration annuelle, concentration journalière et concentration horaire suivant les polluants.

Cette distinction permet de prendre en considération deux types de situations critiques vis-à-vis des effets sur la santé pour ce polluant : d'une part la pollution atmosphérique chronique à l'échelle annuelle, et d'autre part, les épisodes de courte durée, à l'échelle de la journée ou de l'heure.

Afin de juger de l'état de la qualité de l'air, la réglementation s'appuie sur plusieurs notions :

- Les **valeurs limites** sont définies par la réglementation européenne et reprises dans la réglementation française. Elles correspondent à un niveau fixé dans le but d'éviter, de prévenir, ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint. Ce sont des valeurs contraignantes. Elles doivent être respectées chaque année. En cas de dépassement, des plans d'actions doivent être mis en œuvre afin de conduire à une diminution rapide des teneurs en dessous du seuil de la valeur limite. La persistance d'un dépassement peut conduire à un contentieux avec l'Union Européenne.
- Les **objectifs de qualité** sont définis par la réglementation française. Ils correspondent à un niveau à atteindre à long terme et à maintenir, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble.
- Les **valeurs cibles**, définies par les directives européennes, correspondent à un niveau fixé dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée. Elles se rapprochent, dans l'esprit, des objectifs de qualité français afin de garantir un impact faible de la pollution atmosphérique.

- L'Organisation Mondiale de la Santé a mis en place des **lignes directrices relatives à la qualité de l'air** dans le but d'évaluer et de réduire les effets de la pollution atmosphérique sur la santé humaine et sur les écosystèmes. Ces lignes directrices présentent des recommandations d'ordre général concernant **les niveaux d'exposition** (valeurs seuils indicatives) pour différents polluants atmosphériques, **en dessous desquels les effets sont considérés comme acceptables**. Les valeurs recommandées par l'OMS sont fondées sur des études épidémiologiques et toxicologiques.

NORMES FRANÇAISES				
<b>Particules &lt;10µm</b> <b>PM<sub>10</sub></b>	<u>Valeur limite journalière</u>	<u>Valeur limite annuelle</u>	<u>Objectif de qualité</u>	<u>Recommandations OMS</u>
	50 µg/m <sup>3</sup> en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 35 fois par an	40 µg/m <sup>3</sup> en moyenne annuelle	30 µg/m <sup>3</sup> en moyenne annuelle	50 µg/m <sup>3</sup> en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 3 jours par an 20 µg/m <sup>3</sup> en moyenne annuelle
<b>Particules &lt;2,5µm</b> <b>PM<sub>2,5</sub></b>	<u>Valeur limite annuelle</u>	<u>Valeur cible</u>	<u>Objectif de qualité</u>	<u>Recommandations OMS</u>
	25 µg/m <sup>3</sup> en moyenne annuelle	20 µg/m <sup>3</sup> en moyenne annuelle	10 µg/m <sup>3</sup> en moyenne annuelle	25 µg/m <sup>3</sup> en moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 3 jours par an 10 µg/m <sup>3</sup> en moyenne annuelle
<b>Dioxyde d'azote</b> <b>NO<sub>2</sub></b>	<u>Valeur limite horaire</u>	<u>Valeur limite annuelle</u>	<u>Objectif de qualité</u>	<u>Recommandation OMS</u>
	200 µg/m <sup>3</sup> en moyenne horaire à ne pas dépasser plus de 18 fois par an	40 µg/m <sup>3</sup> en moyenne annuelle	40 µg/m <sup>3</sup> en moyenne annuelle	40 µg/m <sup>3</sup> en moyenne annuelle
<b>Benzène</b> <b>C<sub>6</sub>H<sub>6</sub></b>		<u>Valeur limite annuelle</u>	<u>Objectif de qualité</u>	
		5 µg/m <sup>3</sup> en moyenne annuelle	2 µg/m <sup>3</sup> en moyenne annuelle	
<b>Monoxyde de carbone</b> <b>CO</b>	<u>Valeur limite journalière</u>			
	10 000 µg/m <sup>3</sup> en moyenne glissante sur 8 heures			

Tableau 1 : normes de qualité de l'air dans le domaine de surveillance de la qualité de l'air.

### III. SITUATION PAR RAPPORT AUX NORMES DE QUALITE DE L'AIR

Cette année a été marquée par plusieurs épisodes de pollution. En effet, 2019 a comptabilisé **17 journées de déclenchement de la procédure d'information et d'alerte**. Ces déclenchements ont concerné les particules **PM<sub>10</sub>** et l'ozone (**O<sub>3</sub>**), dont une journée concernant ces deux polluants simultanément (le 25 juillet). Dix jours de dépassement du seuil d'information ont été enregistrés pour les particules **PM<sub>10</sub>**, dont 6 en février. Huit jours de dépassement du seuil d'information et un dépassement du seuil d'alerte ont été observés entre le 28 juin et le 27 août 2019 pour l'ozone (**O<sub>3</sub>**). Ces épisodes ont conduit à la mise en place de mesures d'urgence par la Préfecture de Police.

**La diminution des niveaux de dioxyde d'azote (NO<sub>2</sub>) se poursuit en 2019 sur la zone d'étude comme dans l'ensemble de l'agglomération parisienne.** Ceci est cohérent avec la baisse des émissions franciliennes d'oxydes d'azote (trafic routier, industries, chauffage). À proximité du trafic routier, si sur les axes les plus chargés (A13, A12, A86) les niveaux moyens de la valeur limite annuelle (fixée à 40 µg/m<sup>3</sup>) en NO<sub>2</sub> sont ponctuellement dépassés, le nombre d'habitants potentiellement exposés au dépassement de la valeur limite annuelle en NO<sub>2</sub> est non significatif.

**Pour les particules (PM<sub>10</sub>),** malgré une tendance à l'amélioration ces dernières années, la valeur limite journalière (35 jours maximum supérieurs à 50 µg/m<sup>3</sup>) est toujours dépassée à proximité de certains axes de circulation du domaine d'étude tel que l'A12 et aux entrées/sorties du duplex.

Pour les **particules fines PM<sub>2.5</sub>**, la valeur limite et la valeur cible sont respectées. En revanche, **les niveaux moyens annuels sont toujours largement supérieurs aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). En 2019, la quasi-totalité des Franciliens sont concernés par un dépassement des recommandations de l'OMS** (3 jours maximum supérieurs à 25 µg/m<sup>3</sup>).

Concernant **le benzène**, l'objectif de qualité à proximité du trafic routier peut être très ponctuellement dépassé sur la zone d'étude.

En revanche, **le monoxyde de carbone (CO)** n'est plus problématique pour l'air ambiant, sur le domaine comme sur l'Île-de-France.



La situation des différents polluants réglementés par rapport aux normes est présentée en tableau 2 pour la zone autour du Duplex A86.

	Normes à respecter		Normes à respecter dans la mesure du possible		Recommandations OMS
	valeur limite	valeur cible	objectif de qualité		
<b>Particules &lt;10µm</b> <b>PM<sub>10</sub></b>					
<b>Particules &lt;2,5µm</b> <b>PM<sub>2,5</sub></b>					
<b>Dioxyde d'azote</b> <b>NO<sub>2</sub></b>					
<b>Monoxyde de carbone</b> <b>CO</b>					
<b>Benzene</b> <b>C<sub>6</sub>H<sub>6</sub></b>					

Norme :  respectée  dépassée  dépassement peu probable



Tableau 2 : Situation des différents polluants réglementés par rapport aux normes de qualité de l'air dans le domaine de surveillance de l'observatoire du Duplex A86 en 2019

La situation sur la zone d'étude de chaque polluant suivi est détaillée dans les paragraphes suivants.

# IV. QUALITE DE L'AIR SUR LE DOMAINE

## IV.1. Dioxyde d'azote

### IV.1.1. NO<sub>2</sub> à l'échelle annuelle

La cartographie du niveau moyen annuel en dioxyde d'azote (NO<sub>2</sub>) sur la zone d'étude est présentée en figure 3.

a - Dans l'ouest de l'agglomération parisienne




Figure 3 : Cartographie du niveau moyen annuel (en µg/m<sup>3</sup>) en dioxyde d'azote pour l'année 2019 sur le secteur ouest de l'agglomération parisienne (fond de carte Raster IGN)

#### **a- Secteur Ouest de l'agglomération parisienne**

**La répartition spatiale de la pollution constatée sur ce secteur est fortement liée à l'urbanisation et au trafic routier.** Les concentrations en situation de fond (c'est-à-dire éloignée des sources de pollution) sont plus élevées dans le Nord-Est et à l'Est du domaine étudié, cette zone est plus proche du cœur dense de l'agglomération parisienne, où les émissions sont les plus importantes.

La valeur limite annuelle ( $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$  en moyenne) en situation de fond y est toutefois respectée.

Les concentrations en dioxyde d'azote les plus élevées sont rencontrées au droit et au voisinage immédiat des principaux axes du domaine d'étude (essentiellement sur les autoroutes A12, A13, A86 et les nationales). Ces teneurs décroissent dans les deux cents premiers mètres pour atteindre les niveaux de fond.

Dans la partie centrale du domaine, l'autoroute A12, comme sur l'autoroute A13 (Vaucresson, Marnes-La-Coquette,...) présente entre Bailly et Bois-d'Arcy des niveaux plus soutenus que sur le triangle de Rocquencourt. Les niveaux de fond sont sensiblement homogènes.

Ces résultats sont cohérents avec les concentrations relevées sur les stations permanentes franciliennes situées à proximité du trafic. Sur l'année 2019, les niveaux de dioxyde d'azote sur les stations trafic du réseau Airparif sont sensiblement plus faibles qu'en 2018. Le niveau maximum est atteint sur le Boulevard Périphérique, à proximité de la porte d'Auteuil.

#### **b- Entrées/sorties du Duplex A86 de Rueil-Malmaison**

Dans ce secteur, un dépassement très ponctuel de la valeur limite de  $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$  n'est pas exclu au droit de l'ensemble des entrées/sorties Duplex A86 ainsi que sur la partie non concédée de l'A86, où les teneurs les plus élevées sont modélisées. Cependant, le nombre d'habitants concernés par un dépassement de la valeur limite annuelle est très faible. Compte-tenu des incertitudes de la méthode d'estimation, ces chiffres ne sont pas significatifs.

#### **c- Secteur autour de Vaucresson**

Dans ce secteur, les teneurs les plus élevées sont relevées sur la quasi-totalité de l'axe de circulation de l'autoroute A13. Le dépassement de la valeur limite de  $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$  peut être très ponctuellement dépassé au droit de celui-ci. Cependant, le nombre d'habitants concernés par un dépassement de la valeur limite annuelle est très faible. Compte-tenu des incertitudes de la méthode d'estimation, ces chiffres ne sont pas significatifs.

#### **d- Secteur de l'unité de ventilation de Viroflay**

A proximité des entrées/sorties et des unités de ventilation, **la valeur limite est respectée**, ainsi que sur l'ensemble du secteur. En effet, la densité de circulation sur ces axes routiers y est plus faible que les autres secteurs.

#### **e- Secteur de Versailles – Vélizy**

Les teneurs sont plus élevées aux entrées/sorties du Duplex de l'A86 que dans sa portion non concédée. **La valeur limite est respectée sur cet axe, ainsi qu'à proximité immédiate des principaux axes de circulation** de la zone étudiée.

## IV.1.2. NO<sub>2</sub> à l'échelle horaire

La cartographie du nombre d'heures de dépassement de la valeur de 200 µg/m<sup>3</sup> en dioxyde d'azote (NO<sub>2</sub>) sur la zone est présentée en figure 4.

a - Dans l'ouest de l'agglomération parisienne




Figure 4 : Cartographie du nombre d'heures de dépassement de la valeur de 200 µg/m<sup>3</sup> en dioxyde d'azote pour l'année 2019 sur le secteur ouest de l'agglomération parisienne (fond de carte Raster IGN)

La réglementation fixe une valeur limite horaire, fixée à **200 µg/m<sup>3</sup> en moyenne horaire**, à ne pas dépasser plus de **18 heures par an**.

A l'échelle francilienne en 2019, l'ensemble des sites trafic du réseau permanent francilien respectent cette valeur limite horaire.



Malgré un nombre d'heures de dépassement en baisse par rapport à 2018 sur l'ensemble des stations trafic du réseau de mesures d'Airparif et un niveau de fond légèrement plus faible pour l'année 2019, **il n'est pas exclu que la valeur limite horaire ait été très ponctuellement atteinte** aux abords des entrées/sorties du duplex A86 (figure 4). Le nombre d'habitants concernés par un dépassement de la valeur limite horaire est très faible. Compte-tenu des incertitudes de la méthode d'estimation, ces chiffres ne sont pas significatifs.

## IV.2 Particules - PM<sub>10</sub> - PM<sub>2.5</sub>

### IV.2.1. PM<sub>10</sub> : à l'échelle annuelle


La cartographie du niveau moyen annuel de particules PM<sub>10</sub> sur la zone est présentée en figure 5.

a - Dans l'ouest de l'agglomération parisienne




— Duplex A86


b - Aux environs (4 km<sup>2</sup>) des entrées/sorties du Duplex A86 vers Rueil-Malmaison



c - Aux environs (4 km<sup>2</sup>) des entrées/sorties du Duplex A86 vers Vauresson



e - Aux environs (4 km<sup>2</sup>) des entrées/sorties du Duplex A86 Pont Colbert



d - Aux environs (4 km<sup>2</sup>) de Viroflay




Figure 5 : Cartographie du niveau moyen annuel (en µg/m<sup>3</sup>) de particules PM<sub>10</sub> évalué pour l'année 2019 sur le secteur ouest de l'agglomération parisienne (fond de carte Raster IGN)

#### **a- Secteur Ouest de l'agglomération parisienne**

**En situation de fond**, sur l'ensemble de l'agglomération parisienne, les niveaux en PM<sub>10</sub> sont sensiblement homogènes et compris entre 13 et 20 µg/m<sup>3</sup>. Cette homogénéité est due à des sources plus diverses que le dioxyde d'azote.

L'impact des axes routiers de la zone d'étude est très légèrement marqué sur le motif des concentrations, avec des teneurs plus élevées au droit des grandes voies de circulation, telles que les autoroutes A12, A13, et A86.

**L'objectif de qualité (30 µg/m<sup>3</sup> en moyenne annuelle) pour les particules PM<sub>10</sub>, est respecté en situation de fond sur le domaine d'étude. Au droit et au voisinage des axes routiers majeurs, le dépassement de cet objectif est peu probable.**

#### **b- Entrées/sorties du Duplex A86 de Rueil-Malmaison**

**La valeur limite est respectée sur l'ensemble du secteur.** C'est à la hauteur de la portion non concédée de l'A86 et au niveau de l'échangeur que les concentrations les plus élevées sont enregistrées. A ces endroits, le dépassement de l'objectif de qualité est peu probable.

#### **c- Secteur autour de Vaucresson**

**La valeur limite de 40 µg/m<sup>3</sup> en moyenne annuelle est respectée** sur l'ensemble du secteur. **Cependant, il n'est pas exclu que l'objectif de qualité soit très ponctuellement dépassé** au droit de l'autoroute A13. Le nombre d'habitants concernés par ce dépassement de la valeur limite annuelle est très faible. Compte-tenu des incertitudes de la méthode d'estimation, ces chiffres ne sont pas significatifs.

#### **d- Secteur de l'unité de ventilation de Viroflay**

Dans ce secteur, **la valeur limite, comme l'objectif de qualité, sont respectés** sur l'ensemble de ce secteur.

#### **e- Secteur de Versailles – Vélizy**

L'impact de l'A86 est également visible, mais de façon moins marquée que sur l'autoroute A12 ou A13, les concentrations y étant moins élevées de quelques µg/m<sup>3</sup>. Si dans ce secteur la valeur limite de 40 µg/m<sup>3</sup> en moyenne annuelle est respectée, **il n'est pas exclu que l'objectif de qualité soit très ponctuellement dépassé.** Le nombre d'habitants concernés par un dépassement de cet objectif est très faible. Compte-tenu des incertitudes de la méthode d'estimation, ces chiffres ne sont pas significatifs.

**La valeur limite annuelle (40 µg/m<sup>3</sup>) est respectée** sur l'ensemble du domaine.

## IV.2.2. PM<sub>10</sub> : à l'échelle journalière

La cartographie du nombre de jours de dépassement du seuil de 50 µg/m<sup>3</sup> de particules PM<sub>10</sub> sur la zone est présentée en figure 6.




Figure 6 : Cartographie du nombre de jours de dépassement du seuil de 50 µg/m<sup>3</sup> de particules PM<sub>10</sub> évalué pour l'année 2019 sur le secteur ouest de l'agglomération parisienne (fond de carte Raster IGN)

En situation de fond, la valeur limite journalière (50 µg/m<sup>3</sup>, à ne pas dépasser plus de 35 jours par an) est respectée comme sur le reste de l'Île-de-France (sur l'ensemble des sites de fond de l'agglomération parisienne, le nombre de dépassement enregistré est situé entre 1 et 10 jours de dépassements).

En revanche, **la valeur limite journalière est dépassée sur les axes routiers majeurs du domaine d'étude** tel que l'A12 ou l'A13 ainsi que les entrées sorties du duplex A86.

Cela est cohérent avec ce qui est observé sur l'Île-de-France, pour laquelle la valeur limite journalière est dépassée sur les principaux axes routiers (le maximum enregistré est de 67 jours sur la station Autoroute A1 Saint-Denis).

### IV.2.3. PM<sub>2,5</sub> : à l'échelle annuelle

La cartographie du niveau moyen annuel des particules PM<sub>2,5</sub> sur la zone est présentée en figure 7.

a - Dans l'ouest de l'agglomération parisienne




Figure 7 : Cartographie du niveau moyen annuel (en µg/m<sup>3</sup>) de particules PM<sub>2,5</sub> évalué pour l'année 2019 sur le secteur ouest de l'agglomération parisienne (fond de carte Raster IGN)

**Sur le domaine d'étude, comme sur l'ensemble de l'Île-de-France, les niveaux de PM<sub>2,5</sub> sont en-dessous de la valeur limite (25 µg/m<sup>3</sup> en moyenne annuelle), aussi bien en fond qu'à proximité du trafic routier.**

**En situation de proximité au trafic, la valeur cible de 20 µg/m<sup>3</sup> en moyenne annuelle est respectée** sur les principaux axes, tels que les autoroutes A12 et A13. Cette valeur réglementaire est respectée en situation de fond.

**Les niveaux de PM<sub>2,5</sub> estimés sur le domaine d'étude sont supérieurs à l'objectif de qualité français (10 µg/m<sup>3</sup>) en 2019.** Ce constat est similaire sur la quasi-totalité de l'agglomération parisienne en 2019. La moyenne annuelle en PM<sub>2,5</sub> relevée sur les stations de fond localisées dans l'agglomération parisienne est de 11 µg/m<sup>3</sup>.



### IV.3. Benzène

Les niveaux de fond sont homogènes sur l'ensemble de l'agglomération parisienne ainsi que sur le domaine d'étude. Les concentrations sont généralement inférieures à  $1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ .

Bien que **la valeur limite annuelle ( $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) soit largement respectée**, il n'est pas exclu qu'au droit de quelques portions d'axes routiers très limités, l'objectif de qualité ( $2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) soit très ponctuellement dépassé en raison de conditions de circulation congestionnées couplées à une configuration défavorable à la dispersion de la pollution.

### IV.4. Monoxyde de carbone

Les niveaux de monoxyde de carbone les plus importants sont relevés à proximité des voies de circulation. Néanmoins, les concentrations maximales de la moyenne 8 heures estimées sur le domaine d'étude pour l'année 2019 sont très inférieures à la valeur limite de  $10\,000 \mu\text{g}/\text{m}^3$ , comme sur l'ensemble de l'agglomération parisienne.

Il est ainsi probable que les dépassements des normes en têtes de tunnel soient limités, bien que l'impact de l'accumulation des émissions de polluants à l'intérieur d'un tunnel sur l'environnement extérieur soit un phénomène complexe et difficile à modéliser.

Les résultats de l'observatoire de l'A86 Ouest et les observations historiques du réseau d'Airparif permettent de conclure que **les normes de qualité associées au monoxyde de carbone sont respectées sur l'ensemble de l'Île-de-France, même à proximité immédiate des axes routiers les plus importants.**

## V. CONCLUSION

L'ObsAirvatoire A86Ouest (<http://www.obsairvatoire-a86ouest.fr>) permet d'assurer une surveillance permanente de la qualité de l'air dans le secteur des ouvrages, en temps quasi réel. A travers un dispositif qui repose sur un système de modélisation, l'ObsAIRvatoire fournit une information cartographique horaire accessible au public sur les concentrations de dioxyde d'azote (NO<sub>2</sub>), particules (PM<sub>10</sub> et PM<sub>2.5</sub>), benzène, monoxyde de carbone (CO) et de l'ozone (O<sub>3</sub>).

En situation de fond, en dehors de l'influence directe des sources d'émissions, les concentrations sont plus élevées au nord-est du domaine (secteur de Nanterre, Rueil-Malmaison) plus proche du cœur dense de l'agglomération parisienne. C'est à l'ouest et au sud du domaine que les concentrations sont les plus faibles. En effet, cette zone est moins influencée par le cœur de l'agglomération parisienne.

**Pour le dioxyde d'azote**, les teneurs les plus élevées modélisées sont relevées au droit et à proximité directe des axes majeurs du domaine d'étude, tels que l'A12, l'A13 et l'A86 non concédée. Il n'est pas exclu que la valeur limite annuelle (40 µg/m<sup>3</sup>) soit très ponctuellement dépassée. Il en est de même au voisinage immédiat des entrées et sorties de tunnel du Duplex A86. Cependant, le nombre d'habitants concernés par un dépassement de cette valeur limite est très faible. Compte-tenu des incertitudes de la méthode d'estimation, ces chiffres ne sont pas significatifs.

**Pour les particules PM<sub>10</sub>, la valeur limite journalière est dépassée à proximité immédiate des principaux axes routiers du domaine.** Toutefois, les niveaux de pollution diminuent rapidement en s'éloignant du trafic routier et des têtes de tunnel de Rueil-Malmaison et de Pont-Colbert. Les teneurs moyennes mesurées à plus de 200 mètres des têtes de tunnel et du trafic routier empruntant le Duplex A86 restent inférieures aux valeurs limites réglementaires.

**Pour les particules PM<sub>2.5</sub>, la valeur limite est respectée** sur tout le domaine, il en est de même pour la valeur cible. **L'objectif de qualité est dépassé** sur l'ensemble du domaine d'étude, comme sur la quasi-totalité de l'agglomération parisienne.

**Pour le benzène, la valeur limite est largement respectée** en situation de fond comme au sein des échangeurs du Duplex A86. Le risque de dépassement de l'objectif de qualité (2 µg/m<sup>3</sup> en moyenne annuelle) est ponctuellement possible, sur des portions d'axes très limitées, caractérisées par des conditions de circulation congestionnées couplées à une configuration défavorable à la dispersion des émissions.

**Les émissions atmosphériques engendrées par le trafic routier du Duplex A86 n'ont une influence sur les concentrations relevées qu'au plus près du trafic routier et de ses entrées et sorties de tunnels.** Cette contribution est maximale au plus près des têtes du tunnel de Rueil-Malmaison et de Pont Colbert et au droit des têtes de tunnel de Vaucresson pour l'ensemble des polluants étudiés. Au-delà, la contribution du Duplex A86 n'est plus visible sur les concentrations relevées.

**Ainsi, le Duplex A86 ne contribue pas directement aux niveaux de pollution auxquels sont exposés les populations avoisinantes, la distance d'influence du Duplex A86 étant faible.**